

Риск заражения инфекциями, передаваемыми половым путем (ИППП) групп населения с девиантным поведением и студенческой молодежи

Т.А. Сырнева

Уральский НИИ дерматовенерологии и иммунопатологии МЗ РФ

Подростки и молодежь в возрасте от 13 до 19 лет считаются группой наибольшего риска в распространении венерических заболеваний (Прохоренков В.И. и др., 1997; Шакуров И.Г. и др. 1998; Скибицкий В.А., 2000; Лузан Н.В., 2001).

Изменение традиционного образа жизни молодежи, информационная революция, разрушение старых идеалов и несформированность новых создают стрессовые ситуации, способствуют дезориентации личности, бегством от чего является сексуальное экспериментирование, алкоголь, наркотики (Франкjemберг А.А. и др., 1986).

Обобщены результаты анонимного анкетирования с целью изучения социальной и поведенческой характеристики и факторов риска заражения сифилисом и другими ИППП 229 лиц, относящихся к группам риска (наркозависимые, заключенные, больные вирусными гепатитами) и 97 респондентов студентов одного из элитных ВУЗов г. Екатеринбурга.

Подавляющее большинство опрошенных как групп риска, так и студентов – лица в возрасте от 14 до 25 лет, соответственно (82,2-88,0% и 83,8%. Соотношение мужчин и женщин в ядерных группах – 49,9% и 50,1%; у студентов, соответственно, – 54,6% и 45,4%, т.е. группы были сопоставимы по числу респондентов, полу и возрасту, что позволяло проводить корректное сравнение полученных данных.

При изучении отношения респондентов к сексуальным проблемам выявлены определенные особенности исследуемых групп. Так, добравную половую жизнь полностью одобряли 47,4% ПИН, 46,7% заключенных и 38,3% больных вирусными гепатитами (в группе студентов ее одобряли 30,3% опрошенных).

Отношение к случайным половым связям в "ядерных" группах было более сдержанным: их приемлют 32,1% больных гепатитами, 25,6% наркозависимых и 24,1% заключенных (студенты – 29,8%). Обращает на себя внимание тот факт, что последние были более лояльны в

этом вопросе, чем наркозависимые и заключенные. Вместе с тем более треть больных гепатитами приветствовали случайные половые контакты.

Отношение к внебрачным (параллельным) связям было более либеральным и в "ядерных" группах, и среди студентов: их одобряют 76,0% ПИН, 66,3% больных вирусными гепатитами и 62,2% заключенных. Студенты и в этом случае не отличились позитивными нравственными установками – 67,0% респондентов допускали внебрачные сексуальные связи.

Добравные сексуальные связи более других приветствовали наркозависимые и заключенные; внебрачные – наркозависимые и больные гепатитами; случайные половые связи более приемлемы для больных гепатитами. Следует отметить, что группа студентов вполне одобряла как добравные и внебрачные, так и случайные связи.

Ранний сексуальный дебют был более свойственен наркозависимым и заключенным (доля лиц, начинавших половую жизнь в детском возрасте, в этих группах в 3 раза выше, чем у студентов).

Множественные случайные связи более других практиковали наркозависимые и заключенные.

К практике самолечения при заражении сифилисом и другими ИППП чаще других прибегли бы наркозависимые. В то же время доля таких лиц среди заключенных и в группе студентов была практически равной, составляя соответственно 11,5% и 11,1%. На фоне подобного рискованного поведения не применяли барьерных методов контрацепции 45,0% заключенных и 30,4% больных гепатитами. Наркозависимые респонденты и представители группы студентов не использовали средства профилактики почти в равной степени часто (соответственно в 16,4% и 18,6% случаев).

Изучение основных факторов, способствующих риску заражения ИППП (раннее начало

Таблица 1. Риск заражения ИППП у представителей "ядерных" групп

ФАКТОР РИСКА	ДОЛЯ ОПРОШЕННЫХ, %			
	Нарко- зависимые	Больные вирусными гепатитами	Заклученные	Студенты
Сексуальный дебют в 13-14 лет	32,9	26,0	31,8	10,3
Многочисленные сексуальные связи с разными партнерами, в т.ч. с проститутками	29,5	27,1	24,7	15,1
Секс в первые часы знакомства	29,9	18,8	16,9	21,0
Экстенсивные сексуальные контакты (8 и более партнеров в течение последних 6 месяцев)	20,0	14,9	16,8	13,4
Регулярное употребление наркотиков	97,4	42,4	75,2	16,0
Самолечение	15,3	8,4	11,5	11,1
Ориентация на частую смену половых партнеров	37,2	33,3	28,8	31,7
Неиспользование средств профилактики	16,4	30,4	45,0	18,6
Индекс риска, баллы	278,6	201,3	250,7	137,3

половой жизни, промискуитетные связи, практика самолечения, опыт употребления наркотиков, отсутствие навыков безопасного секса), позволило выявить характерные для исследуемых групп основные варианты сексуального поведения различной степени риска (умеренный, высокий, чрезвычайно высокий). Степень риска мы устанавливали при помощи предложенного нами индекса риска. На основании этого индекса показано, что чрезвычайно высокий риск заражения венерическими болезнями характерен для наркозависимых и заключенных (индекс риска 278,6 и 250,7 балла соответственно). Высокий риск заражения - у больных вирусными парентеральными гепатитами (ин-

декс риска - 201,3). Умеренный риск заражения ИППП выявлен в группе студентов (индекс риска - 137,3 балла) (таблица 1).

Таким образом, риск заражения "обычной" молодежной субпопуляции достаточно высок, и границы между этой группой населения и группами лиц с девиантным поведением условны, поскольку установки и ориентации на добрые и параллельные (внебрачные) сексуальные связи у респондентов во многом совпадали. Тем не менее реальная практика сексуального поведения у представителей фокусных групп и студенческой группы была различной и зависела от социальной среды и окружения.

Литература

1. Лузан Н.В. Лечебно-профилактическая помощь детям и подросткам с инфекциями, передаваемым половым путем: Автореф. дис. ... д-ра мед. наук. Новосибирск, 2001. 43 с.
2. Прохоренков В.И. и др. К проблеме заболеваний, передаваемых половым путем, в Енисейском регионе Восточной Сибири // Заболевания, передаваемые половым путем. 1997. № 4. С. 27-29.
3. Скибицкий В.А. Роль медико-социальных, эпидемиологических и конституционально-психологических факторов в формировании групп риска по инфекциям, передаваемым половым путем, среди подростков: Автореф. дис. ... канд. мед. наук. Новосибирск, 2000. 16 с.
4. Франкемберг А.А. и др. Психологическая и социальная характеристика некоторых контингентов женщин, обследованных на венерические болезни // Вестн. дерматологии и венерологии. 1986. № 10. с. 74-76.
5. Шакуров И.Г. и др. Опыт работы Самарского областного кожно-венерологического диспансера по оказанию венерологической помощи на дому // Вестн. дерматологии и венерологии. 1998. № 4. С. 24.