МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РСФСР
СВЕРДЛОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОРДЕНА
ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ
МЕДИЦИНСКИЙ ИНСТИТУТ

На правах рукописи

ВОЕВОДИН
Игорь Всеволодович

**ХАРАКТЕРИСТИКА
ЛИКВОРОДИНАМИЧЕСКИХ НАРУШЕНИЙ
И ИСХОДОВ ГНОЙНЫХ МЕНИНГИТОВ
У ДЕТЕЙ**

(14.00.09. — педиатрия)
УДК 616.831.09-002.3 + 616.981.232

Автореферат
диссертации на соискание ученой степени
кандидата медицинских наук

Работа выполнена в Кемеровском государственном медицинском институте

Научные руководители:

Заслуженный деятель науки РСФСР,
доктор медицинских наук,
профессор **Дроздов В. Н.**
Доктор медицинских наук,
профессор **Семенов В. Н.**

Официальные оппоненты:

доктор медицинских наук,
профессор **Рудакова Р. И.**
доктор медицинских наук,
профессор **Гринкевич О. В.**

Ведущее учреждение — Второй Московский ордена Ленина
государственный медицинский институт
им. Н. И. Пирогова

Актуальность проблемы. Гнойные менингиты занимают важное место среди нейроинфекционных заболеваний у детей (М.Б.Цукер, 1975; В.И.Покровский с соавт., 1976; *Calomfirescu et al.* 1974).

В последние годы проведены многосторонние исследования в изучении патогенеза и клинического течения гнойных менингитов. Выявленные изменения гомеостаза, нарушения центрального и периферического кровообращения, внешнего и тканевого дыхания, изменения кислотно-обменного состояния и газового состава ликвора (М.В.Горячкина, 1971; В.И.Покровский, Т.Е.Черняева, 1973; Т.Е.Черняева, 1975; Э.М.Осна и соавт., 1976), а также показателей белково-аминокислотного и липидного обмена при гнойных менингитах (А.Ю.Макаров, 1973; Г.И.Кожевина, 1979; Ф.В.Носкова, 1979) позволили снизить летальность при этом тяжелом заболевании и улучшить ближайшие исходы. Однако литературные данные свидетельствуют о том, что процент последствий гнойных менингитов и при современных схемах лечения остается высоким (Н.Я.Покровская и соавт., 1975; Л.И.Радионенко, 1979 и др.). Среди них гипертензионно-гидроцефальный синдром и гидроцефалия составляют 3-17,3 % и 0,5-1,3 % соответственно (В.Я.Давыдов, 1974; В.П.Арбекова и соавт., 1975; Е.В.Лещинская и соавт., 1975; Р.И.Иванова, 1976; И.Н.Латышев и соавт., 1978).

В возникновении гидроцефалии у детей многие авторы (А.А.Арендт, 1948; А.А.Бекрицкий, 1949; Л.А.Корейша, 1959; Н.М.Линченко, 1961; В.Н.Семенов, 1973; Б.П.Симерницкий, 1978) признают ведущую роль расстройств ликвородинамики в результате перенесенного или вялотекущего воспалительного процесса в оболочках мозга, эпидеме и сосудистых сплетениях мозга.

Многие авторы (Е.Г.Пашковская, 1975; Р.И.Рудакова и соавт., 1976; В.И.Покровский и Н.Я.Покровская, 1980; *J. Ghosh et al.*, 1971; Ж.Кънева, 1979 и др.) указывают на расстройства ликвородинамики при гнойном менингите, однако их характер изучен недостаточно. Не разработаны также методики исследования ликвородинамики, допустимые для исследования в остром периоде гнойного менингита, когда наблюдается тяжелое состояние больного.

В то же время раскрытие механизмов нарушения ликвородинамики в остром периоде гнойного менингита и патогенетическое их лечение несомненно могут явиться профилактикой развития ликвородинамических расстройств и снизить число последствий гнойного менингита в отдаленном периоде, в том числе гипертензионно-гидроцефального синдрома и гидроцефалии.

Цель работы. Основной целью работы было изучение расстройств ликвородинамики в остром и отдаленном периодах гнойного менингита с определением состояния полостной системы мозга и состояния ликворообращения для углубления представлений о патогенезе выявленных расстройств, ранней диагностики гипертензионно-гидроцефального синдрома и гидроцефалии.

Основные задачи исследования.

1. Изучение характера расстройств ликвородинамики в остром и отдаленном периодах гнойного менингита.

2. Сопоставление клинико-лабораторных показателей с измененной ликвородинамикой.

3. Определение комплекса методов исследования расстройств ликвородинамики у больных гнойными менингитами для ранней диагностики гипертензионно-гидроцефального синдрома и гидроцефалии.

4. Изучение исходов гнойных менингитов в анамнезе.

5. Обоснование патогенетического лечения расстройств ликвородинамики в остром периоде заболевания и на раннем этапе восстановительного периода.

На защиту выносятся следующие положения.

1. Исследования ликвородинамики в остром и отдаленном периодах гнойного менингита позволяют углубить представления о патогенезе развития гипертензионно-гидроцефального синдрома и гидроцефалии вследствие перенесенного заболевания.

2. Ликвородинамические нарушения при гнойном менингите не приходят к норме ко времени нормализации клеточного состава ликвора. Поэтому изучение ликвородинамики можно рекомендовать для решения вопроса о выписке больных и диспансеризации реконвалесцентов.

3. Из различных методов исследования ликвородинамики наиболее информативными и доступными в практической работе яв-

ляются определение ликворного давления, величины дефицита ликворообращения и эхоэнцефалография с оценкой состояния полостной системы головного мозга.

Научная новизна исследования. У детей в остром и резидуальном периодах гнойного менингита проведены исследования расстройств ликвородинамики с определением ликворного давления и величины дефицита ликворообращения по методу В.Н.Семенова, с применением эхоэнцефалографии и с изучением последствий заболевания.

В период реконвалесценции выявлены нарушения ликвородинамики, которые противоречат общепринятым представлениям о выздоровлении. Определен комплекс методов исследования расстройств ликвородинамики для ранней диагностики гипертензионно-гидроцефального синдрома и гидроцефалии, развившихся вследствие перенесенного гнойного менингита, что будет способствовать своевременному выявлению и лечению данных последствий. В анамнезе прослежена динамика ликвороциркуляторных расстройств.

Модифицировано "Устройство для определения величины дефицита ликворообращения" В.Н.Семенова и А.М.Бурханова, что позволило упростить методику определения данного показателя и сделало ее доступной для широкого круга практических врачей.

Предложено использовать метод определения величины дефицита ликворообращения и эхоэнцефалографию вместе с другими общепринятыми методами в качестве критериев полноты выздоровления и прогноза.

Практическая ценность работы. Вопрос об исходе и выписке переболевших гнойным менингитом из стационара должен решаться с учетом состояния ликвородинамики.

В связи с тем, что нормализация ликвородинамики происходит позднее, чем нормализуется состояние больных и общепринятые лабораторные показатели ликвора и периферической крови, состояние ликвородинамики может служить критерием выздоровления, а исследование ее должно проводиться не только в период пребывания больного в стационаре, но и при диспансерном наблюдении за реконвалесцентами.

Наиболее информативными и доступными методами для выявле-

ния ликвородинамических нарушений являются определение ликворного давления, величины дефицита ликворообращения и эхоэнцефалография с оценкой состояния полостной системы головного мозга.

Своевременное выявление ликвородинамических расстройств позволило уменьшить частоту последствий гнойного менингита.

Реализация работы. Результаты работы внедрены в практику городской инфекционной больницы № 8, областной больницы № 1 и неврологических кабинетов детских поликлиник г. Кемерово по наблюдению за детьми, перенесшими гнойный менингит. Проведено восемь семинаров с практическими врачами инфекционной больницы № 8 и детских психоневрологических больниц города и области.

Материалы работы доложены на 10 съезде врачей Кузбасса (1978), конференции молодых ученых области (1979), заседании областного общества детских врачей (1980), научной конференции КГМИ, посвященной 110-й годовщине со дня рождения В.И. Ленина (1960), заседании областного общества инфекционистов (1961), совместной научной конференции кафедры детских инфекций и проблемной лаборатории "Болезни печени у детей" 2 МОЛГМИ имени Н.И. Пирогова и академгруппы академика АМН СССР, проф. Н.И. Нисевич (1962), республиканской научно-практической конференции "Актуальные вопросы острых респираторно-вирусных и нейроинфекций у детей" (1982).

Публикации. По теме диссертации опубликовано 7 печатных работ, подано и внедрено в практику рационализаторское предложение отраслевого значения "Устройство для определения ликвородефицита", которое зарегистрировано 11 апреля 1960 г. за № 0-1351 во 2-м МОЛГМИ.

Объем и структура диссертации. Диссертация состоит из введения, 4 глав, заключения, выводов, практических рекомендаций и библиографического указателя, включающего 159 отечественных и 32 иностранных источников. Работа изложена на 131 страницах машинописного текста, иллюстрирована 23 таблицами и 10 рисунками, 9 выписками из историй болезни.

Весь материал, представленный в диссертации, получен, обработан и проанализирован лично автором. При необходимости

пользовались клиническими консультациями невропатолога, психиатра, сурдолога, оториноларинголога и окулиста.

Общее руководство и клиническая часть работы осуществлялись заслуженным деятелем науки РСФСР, профессором В.Н.Дроздовым, а функциональные исследования ликвородинамики проводились под руководством доктора медицинских наук, профессора В.Н.Семенова.

Содержание работы. Материалы и методы исследования.

Нами проведено исследование состояния ликвородинамики у 327 детей в остром периоде болезни, а последствия гнойного менингита изучены в катанезе у 204 детей в сроки от I месяца до 9 лет после заболевания.

На момент заболевания все дети были в возрасте от I месяца до 10 лет. Основная часть, 70,8 % детей, приходилась на возраст до трех лет.

Менингококковый гнойный менингит диагностирован у 90,7 % больных, пневмококковый и стафилококковый - у 4,2 %. В 5,1 % случаев этиология гнойного менингита не установлена. Гнойный менингит наблюдался у 91,2 % больных, менингоэнцефалит - у 8,8 %. Легкую форму заболевания мы не наблюдали ни у одного ребенка. Среднетяжелая форма отмечена у 10,2 % больных, а тяжелая - у 89,8 %.

В первые три дня болезни госпитализировано 72,4 %, на 4-5 день - 20,5 % и позже 5-го дня - 7,1 % детей.

В клинической картине гнойного менингита наиболее часто наблюдались: подъем температуры до 38-40°C (97,8 % больных), головная боль у детей старше 2-х лет (95,4 %), рвота (84,2%), ригидность мышц затылка и спины (73,4 %), симптомы Кернига (40,5 %) и Брудзинского (30,0 %), изменение сухожильных рефлексов (65,9 %), напряжение и выбухание большого родничка у грудных детей (63,4 %), гиперестезия кожных покровов (47,3%), патологические рефлексы у детей старше 2-х лет (23,7 %), снижение или отсутствие брюшных рефлексов (41,7 %), нарушение сознания (38,8 %), судороги (21,7 %).

Изменения периферической крови характеризовались выраженным лейкоцитозом, нейтрофилезом со сдвигом влево и высокой СОЭ.

В преобладающем большинстве случаев ликвор был мутный, вытекал под повышенным давлением. Общее содержание белка в ликворе было повышено, цитоз достигал высоких цифр, от 1000 до 5000 и выше в 1 мкл.

В результате проведенного лечения выздоровление от гнойного менингита наступило у 96,3 % детей. Летальный исход наступил у 3,7 % больных.

Для изучения ликвородинамических нарушений и исходов гнойных менингитов у детей использовали клинический метод, измерение ликворного давления, определение величины дефицита ликворообращения (по методу, предложенному В.Н.Семеновым в 1973 г.), эхоэнцефалографию, электроэнцефалографию, пневмоэнцефалографию, красочные пробы и радиоизотопные методы исследования.

Для определения величины дефицита ликворообращения нами было использовано модифицированное устройство (рис.1).

Изучение ликвородинамических расстройств проводилось в период разгара заболевания, в период нормализации клеточного состава ликвора, а также перед выпиской из стационара и в катамнезе.

При определении ликворной гипертензии руководствовались данными Ю.Я.Якунина, Ю.И.Барашнева (1979), Е.Цветановой (1980) (нормальное ликворное давление в положении лежа у детей колеблется от 30 до 100 мм вод.ст. в зависимости от возраста). За нормальную продукцию ликвора у здорового человека взяты данные *E. Alther* (1968), *A. Lorenzo et al.* (1970) - 0,3-0,4 мл/мин.

Учитывая, что крик, беспокойство значительно повышают ликворное давление, измерение его и определение величины дефицита ликворообращения проводили в спокойном состоянии ребенка, которое достигалось: назначением седативных препаратов за 30-40 минут до исследования и выполнением лямбальной пункции под местной анестезией.

В остром периоде гнойного менингита исследование ликвородинамики проводилось одновременно с проведением лечебно-диагностической и контрольной лямбальной пункциями, частота которых определялась динамикой основного заболевания.

Рис. I. Устройство для определения ликвороден-
сита.

1. Манометрический капилляр.
2. Капилляр установленный на уровне физиологического ликворного давления.
3. Выпускной кран.
4. Измерительная пробирка.
5. Резиновая манжетка с пластмассовой канцлей.

Результаты исследования.

При определении ликворного давления нами получены следующие величины, представленные на рисунке 2.

В разгар заболевания ликворное давление в лямбальном канале превышало нормативные показатели в 2-3 раза у 82,0 %, а более чем в 4 раза - у 11,3 % больных. Лишь у 6,7 % детей не возможно было определить истинное ликворное давление ввиду выраженной вязкости ликвора. Признаки ликворной гипертензии выявлены у всех детей, обследованных эхоэнцефалографическим методом.

С целью установления механизма и степени нарушения ликворообращения в период разгара гнойного менингита величина дефицита ликворообращения определена у 58 больных. Значение этой величины колебалось от 0,6 до 1,8 мл/мин, в среднем $0,99 \pm 0,05$ мл/мин. Величина дефицита ликворообращения зависела от возраста больных и тяжести клинического течения. Чем тяжелее протекал гнойный менингит, тем более выраженными были расстройство ликворообращения. Наибольшие значения данной величины наблюдались у детей первого года жизни.

Превышение величины дефицита ликворообращения нормальной величины продукции ликвора более, чем на 100 % свидетельствовало о том, что в период разгара заболевания одним из ведущих факторов, обуславливающих высокое ликворное давление, является повышенная продукция ликвора, которая возникает вследствие опосредованного токсического воздействия на сосудистые сплетения через вегетативную нервную систему, и воспалительного процесса в эпендиме и хориоидальных сплетениях.

Определение ликворного давления к моменту нормализации клеточного состава ликвора показало, что нормализация ликворного давления к этому времени произошла только у 56,6 % детей. Тенденция к снижению повышенного давления наблюдалась у 32,7 %. Вместе с тем, у 10,7 % детей ликворное давление было значительно повышенным и превышало нормативные цифры в 3-4 раза. У детей с повышенным ликворным давлением величина дефицита ликворообращения колебалась в пределах от 0,4 до 1,6 мл/мин. Среднее значение этого показателя у данной группы детей составило $0,71 \pm 0,04$ мл/мин, что указывает на по-

Рис. 2 Величина ликворного давления при гнойном менингите у детей

- в разгар болезни

- в период нормализации клеточного состава ликвора

вышенную ликворопродукцию у детей с ликворной гипертензией в период нормализации клеточного состава ликвора.

Степень нарушения ликворообращения была более выраженной у детей до трех лет, особенно у детей первых шести месяцев жизни, чем у детей старшего возраста.

Сравнительный анализ двух групп больных, леченных с применением диакарба или лазикса, показал, что большей эффективностью по нормализации нарушенной ликвородинамики и снижению ликворного давления обладает диакарб (таблица I).

Таблица I.

Сравнительная эффективность действия диакарба и лазикса на продукцию ликвора и внутричерепную гипертензию

Препарат	Средняя величина дефицита ликворообращения в мл/мин. $M \pm m$		Средняя величина ликворного давления в мм вод.ст. $M \pm m$	
	в разгар болезни	в период нормализации клеточного состава ликвора	в разгар болезни	в период нормализации клеточного состава ликвора
Лазикс (96 больных)	$0,98 \pm 0,05$	$0,83 \pm 0,06$	$243 \pm 10,1$	$152 \pm 6,8$
Диакарб (107 больных)	$0,99 \pm 0,07$	$0,61 \pm 0,03$	$240 \pm 9,6$	$128 \pm 4,7$
P	$> 0,05$	$< 0,01$	$> 0,05$	$< 0,01$

В период нормализации клеточного состава ликвора у 25 из 46 детей на эхоэнцефалограммах обнаружены изменения, указывающие на гипертензионно-гидроцефальный синдром, но они были менее выраженными, чем в разгар заболевания, за исключением трех случаев с гидроцефалией.

При выписке из стационара эхоэнцефалографическое исследование установило наличие ликворной гипертензии у 17 из 46 обследованных реконвалесцентов.

В первые 1-3 месяца после выписки из стационара те или иные последствия гнойного менингита и менингоэнцефалита обнаружены у 77,9 % реконвалесцентов. Только у 22,1 % детей со стороны неврологического и психического статуса не отмеча-

лось остаточных явлений. Качественная характеристика выявленных в анамнезе нарушений, представлена в таблице 2.

Таблица 2.

Анамнез детей, перенесших гнойные менингиты различной этиологии

И с х о д ы	Количество де- тей (всего-204)	%	$\pm m$	P
Выздоровление без остаточных явлений	45	22,1	6,9	< 0,01
Церебрастенический синдром	75	36,7	5,8	< 0,01
Органические поражения центральной нервной системы	84	41,2	5,2	< 0,01
в том числе:				
гипертензионно-гидроцефальный синдром	34	16,7	6,3	< 0,05
гидроцефалия	8	3,9	7,3	> 0,05
нарушения психической сферы	19	9,3	6,9	> 0,05

Часто, у 36,7 % осмотренных, выявлялся церебрастенический синдром. У части детей с указанным синдромом имелась незначительная очаговая симптоматика. Церебрастенический синдром не был стойким и в большинстве наблюдений исчезал в течение 3 мес.-1 года после перенесенного заболевания под влиянием лечебных мер. Длительно сохраняющиеся явления астении отмечены в единичных случаях при отсутствии своевременно проводимой терапии.

Очаговые поражения центральной нервной системы выявлены у 41,2 % реконвалесцентов. Чаще, у 27,0 % обследованных наблюдались отдельные симптомы пирамидной недостаточности. Гемипарезы отмечены у 4,4 %, а тетрапарезы у 2,5 % детей, в основном у лиц, страдающих гидроцефалией. Поражения черепно-мозговых нервов обнаружены у 8,8 % детей и касались, главным образом, отводящего и слухового нервов. Приступы судорог появлялись в сроки от 6 месяцев до 6 лет после перенесенного

заболевания у 3,4 % детей и лишь в одном случае на первом месяце реконвалесценции. Эпилептиформный синдром в виде снохождения, кратковременной потери сознания без судорог наблюдался у 4,9 % реконвалесцентов. Эндокринопатия диагностирована в 1,0 % случаях, по истечении 3-4 лет после болезни.

Из нарушений психической сферы, которые имели место у 9,3 % детей, чаще встречались задержка психического развития у 5,9 % и психопатоподобные состояния у 2,5 %.

У всех 29 детей с очаговыми поражениями центральной нервной системы, которым проведена электроэнцефалография, на электроэнцефалограммах зарегистрированы изменения биоэлектрической активности головного мозга.

Гипертензионно-гидроцефальный синдром выявлен у 34, что составило 16,7 % детей. У 25 из них обнаружены разнообразные неврологические расстройства. Чаще, у 14 детей этой группы, наблюдались функциональные нарушения центральной нервной системы. Очаговые повреждения нервной системы имели место у 11 реконвалесцентов и часто проявлялись в виде очаговой микросимптоматики. Грубые поражения центральной нервной системы в виде эпилептических припадков, косоглазия, нарушения слуха, гемипареза и других расстройств отмечены у 7 детей.

Признаки внутричерепной гипертензии на обзорных краниограммах имелись у 17, а изменения на глазном дне у 9 из 34 детей с гипертензионным синдромом. Диффузные изменения биоэлектрической активности головного мозга зарегистрированы у 13 из 14 детей, которым проведено электроэнцефалографическое исследование.

Ликворное давление в этой группе детей превышало нормативные показатели в 1,5-2 раза. Величина дефицита ликворообращения колебалась в пределах от 0,5 до 0,7 мл/мин, что свидетельствовало о гиперпродукции ликвора.

Гипертензионный синдром обычными методами диагностики выявлен на 2-6 месяце реконвалесценции у 8 из 109 детей, что составило 7,3 %. Из 8 детей с гипертензионным синдромом лишь только 2-е перенесли гнойный менингит в раннем детском возрасте, а остальные - в более старшем возрасте.

Наши результаты о сроках, частоте выявления гипертензион-

ного синдрома не согласуются с литературными данными. Сочетание эхоэнцефалографического метода исследования с обычными методами дало увеличение выявляемости гипертензионно-гидроцефального синдрома, который обнаружен у 26 из 95 обследованных, что составило 27,4 %.

На основании проведенного анализа эхоэнцефалограмм, полученных при выписке и в катамнезе, вытекает, что гипертензионный синдром развивается сразу же после острого периода на раннем этапе восстановительного периода, а не в катамнезе.

Причину того, что гипертензионно-гидроцефальный синдром не диагностируется обычными методами исследования в ранние сроки мы видим в том, что у значительной части реконвалесцентов данный синдром протекает субклинически или маскируется другими остаточными явлениями, в частности, церебрастеническим синдромом. Лишь у определенной части реконвалесцентов, чаще на 2-6 месяце наступает его декомпенсация, что находит отражение в клинической картине. В большинстве случаев вышеуказанный синдром поддается консервативной терапии и со временем исчезает, в ряде случаев он приобретает длительный и стойкий характер, приводя в конечном итоге к развитию гидроцефалии.

Продолжительность гипертензионно-гидроцефального синдрома во многом зависит от сроков его выявления и лечения. При распознавании данного синдрома на 2-6 месяце реконвалесценции продолжительность его составила от 3 мес. до 3 лет. Более длительное существование гипертензионно-гидроцефального синдрома мы обнаружили при обследовании детей эхоэнцефалографическим методом, когда этот синдром был впервые диагностирован на 3-7 году после перенесенного гнойного менингита. Однако, выявление его в раннем восстановительном периоде исключало длительное и стойкое его развитие. В группе больных, у которых гипертензионно-гидроцефальный синдром выявлен еще в стационаре, он был излечен под влиянием проводимой терапии в сроки от 3 месяцев до 1 года.

Развитие гидроцефалии зарегистрировано у 4 % детей, как правило после гнойных менингитов неменингококковой этиологии. Изучение ликвородинамики показало преобладание гиперсекре-

торных форм.

Тяжелые органические поражения центральной нервной системы наблюдались преимущественно у детей, переболевших менингококковым гнойным менингитом и менингоэнцефалитом в возрасте до года, а также в случаях поздно начатого лечения.

Проводимая восстановительная терапия у детей с последствиями гнойных менингитов определяется клинической формой поражения нервной системы.

Лечение гидроцефалии проводилось в соответствии с выявленным механизмом нарушенной ликвороциркуляции. Успешный исход наблюдался у половины больных, прооперированных по поводу гидроцефалии.

Таким образом, проведенные исследования и наблюдения позволили установить частоту и характер ликвородинамических расстройств на различных стадиях гнойных менингитов у детей, установить их роль и значение в развитии гипертензионно-гидроцефального синдрома и гидроцефалии в резидуальном периоде и определить значение последних в развитии последствий. Одновременно с этим изучена динамика последствий гнойных менингитов и течение гипертензионно-гидроцефального синдрома и гидроцефалии при целенаправленном лечении в остром и отдаленном периодах.

Разработана схема обследования и лечения больных в остром и отдаленном периодах при наличии ликвородинамических расстройств, показана необходимость длительного диспансерного наблюдения и лечения детей, перенесших гнойный менингит, с целью профилактики и снижения последствий, а также лечения постменингитической гидроцефалии.

ВЫВОДЫ

1. По нашим данным у детей с гнойными менингитами в период разгара заболевания наблюдаются расстройства ликвородинамики с повышением внутричерепного (ликворного) давления. К моменту нормализации клеточного состава ликвора и у реконвалесцентов эти расстройства сохраняются более чем у трети переболевших. Поэтому состояние ликвородинамики должно быть включено в критерии клинического выздоровления больного.

2. В резидуальном периоде гнойных менингитов расстройства ликвородинамики обнаруживаются у 20,6 % перенесших заболевание, проявляясь чаще гипертензионно-гидроцефальным синдромом и реже - гидроцефалией.

3. Наличие и характер расстройств ликвородинамики в остром и отдаленном периодах гнойного менингита у детей не всегда выявляются общеклиническим обследованием и могут быть определены с помощью эхоэнцефалографии, измерения ликворного давления и определения величины дефицита ликворообращения при люмбальной пункции, которые безопасны и достаточно информативны. Другие, более сложные методы, следует применять при развитии гипертензионно-гидроцефального синдрома и гидроцефалии.

4. По механизму развития внутричерепная гипертензия, как в остром, так и в отдаленном периодах гнойного менингита в большинстве случаев является следствием гиперпродукции ликвора. В отдельных случаях может иметь место нарушение резорбции или развиваться воспалительная окклюзия. Частота, характер и степень расстройств ликвородинамики, усугубляющих течение гнойного менингита в остром периоде, развитие гипертензионно-гидроцефального синдрома и гидроцефалии - в резидуальном, указывают на необходимость своевременного их распознавания и активного лечения.

5. По данным катамнеза в сроки наблюдения от 3-х месяцев до 9 лет у детей, перенесших гнойные менингиты различной этиологии, выявляются последствия в 77,9 % случаев в виде синдромов органического поражения центральной нервной системы, церебрастении, нарушений психической сферы, гипертензи-

онно-гидроцефального синдрома и гидроцефалии. Гипертензионно-гидроцефальный синдром и гидроцефалия сами по себе сопровождаются функциональными и органическими поражениями нервной системы, что усугубляет и увеличивает процент последствий гнойных менингитов у детей.

6. На всех этапах гнойного менингита при наличии ликвородинамических нарушений должна проводиться дегидратационная терапия. Наиболее эффективным по снижению внутричерепного давления и нормализации ликвородинамики из медикаментозных средств является диакарб.

7. Комплексная и своевременная терапия расстройств ликвородинамики и поражений нервной системы в различные периоды гнойных менингитов снижает процент последствий. Поэтому дети, перенесшие гнойный менингит, подлежат длительному диспансерному наблюдению и лечению выявляемых последствий, что может быть осуществлено в условиях поликлиники, неврологического и психоневрологического стационара. Дети с постменингитической гидроцефалией подлежат обследованию и лечению в специализированных (детских хирургических и нейрохирургических) стационарах.

Практические рекомендации.

1. У всех больных с гнойными менингитами в остром периоде необходимо исследовать состояние ликвородинамики. В необходимый минимум обследований рекомендуем включать измерение ликворного давления с определением величины дефицита ликворообращения и эхоэнцефалографию.

2. Для измерения ликворного давления и определения величины дефицита ликворообращения предлагаем использовать модифицированное устройство.

3. При выявлении расстройств ликвородинамики в комплекс лечебных мер острого гнойного менингита следует включать диакарб. Препарат назначается в дозе от 10 до 50 мг на кг массы тела в сутки по прерывистой схеме (три дня прием с перерывом на четвертый) в течение всего острого периода.

При сохранении внутричерепной гипертензии в период реконвалесценции курс лечения следует продолжить в течение 1-2 месяцев.

4. При развитии стойкого гипертензионно-гидроцефального синдрома и гидроцефалии больные должны направляться на обследование и лечение в специализированные стационары (неврологические, нейрохирургические).

С П И С О К

работ, опубликованных по теме диссертации

1. Клинические особенности менингококковой инфекции у детей на современном этапе. - В кн.: Острые инфекции у детей: Тез.межобластной науч.-практ.конф. Кемерово, 1980, с.7-9.

2. Состояние ликворообращения в острой стадии гнойных менингитов у детей. - В кн.: Профилактика, диагностика и лечение заболеваний человека: Тез.докладов к науч.-практ.конф. Кемерово, 1980, с.336-339.

3. Катамнез больных, перенесших гнойные менингиты и менингоэнцефалиты. - В кн.: Профилактика, диагностика и лечение заболеваний человека: Тез.докл.к науч.-практ.конф. Кемерово, 1980, с.341-344.

4. Характеристика ликвородинамических нарушений в остром и резидуальном периодах гнойного менингита у детей и их последствия. - В кн.: Острые инфекции у детей: Тезисы докл.меж-обл.научн.-практ.конф. Кемерово, 1981, с.107-110.

5. Устройство для определения ликвородефицита. - В кн.: Тезисы докл.и сообщений к научн.-практ.конф. "Опыт развития творчества, изобретательства...", посвященной 25-летию Кемеровского мединститута, Кемерово, 1981, с.15-16.