

НЕСПЕЦИФИЧЕСКИЕ ВУЛЬВОВАГИНИТЫ В ПРАКТИКЕ ДЕТСКОГО ГИНЕКОЛОГА

Аскерова М. Г., Ткаченко Е. А., Чиркова Л. В.

ГОУ ВПО «УрГМА Росздрави», г. Екатеринбург, Россия

Воспалительные заболевания наружных половых органов занимают лидирующее место среди патологии, встречающейся в детской практике, и являются причиной многократного обращения к детскому гинекологу.

С целью оценить эффективность терапии неспецифических вульвовагинитов (НВВ) препаратом Гексикон Д на базе поликлинического отделения МУ ДГКБ №9 г. Екатеринбурга проведено клинико-лабораторное исследование 78 пациенток в возрасте от 1 года до 16 лет с диагнозом НВВ. Девочкам в возрасте от 10-15 лет (n=55 – 71%) было проведено лечение препаратом Гексикон Д в виде суппозиторий вагинальных и девочкам до 10 лет назначался Гексикон гель (n=23 – 29%) по схеме 2 раза в день, продолжительностью 7-10 дней.

На фоне лечения 75 (96%) пациенток отметили отсутствие субъективных и объективных клинических признаков воспалительного процесса. У 70 (89%) пациенток нормализовались лабораторные данные, у 5 (6%) сохранялся воспалительный тип мазка при отсутствии жалоб. 3 (3%) девочкам лечение Гексикон гелем было прекращено на 2–3 суток из-за индивидуальной непереносимости. Среди пациенток, применявших Гексикон Д (55) не было отмечено случаев непереносимости препарата. Через месяц после лечения рецидивирующее течение отмечено у 2 (2%) девочек, применявших Гексикон гель. 73 (93,5%) пациентки жалоб не предъявляли. Через 6 месяцев после лечения рецидив НВВ выявлен у 3 девочек в возрасте до 10 лет, и 1 пациентки в возрасте до менархе, применявшей вагинальные свечи.

Таким образом, общая эффективность лечения гелем Гексикон составила 78,3%, свечами Гексикон Д – 100% (после лечения) и 98% через 6 месяцев. У 13% пациенток применявшим Гексикон гель, отмечена индивидуальная непереносимость, чего не было у пациенток, применявших Гексикон Д.