

1. Проведен ретроспективный анализ медицинской документации (историй болезни, амбулаторных карт) 58 пациентов (75 глаз) с врожденной катарактой. Срок наблюдения составил от 6 месяцев до 5 лет. Отдаленные результаты прослежены у 41 пациента (58 глаз).

2. Получены следующие результаты: в 16 случаях (28%) после проведенного оперативного вмешательства получено зрение более 0,4, что дает возможность развития бинокулярного зрения.

3. У 5 детей с тяжелой сопутствующей патологией оперативное лечение было проведено с органосохранной целью.

4. Необходимо продолжение лечения, адекватная коррекция афакии (контактная коррекция, интраокулярная коррекция) для дальнейшего повышения остроты зрения.

5. Необходимо продолжение исследования для оценки результатов по окончании лечения.

Литература:

1. Зайдуллин И.С. Изменение параметров глаза в отдаленные сроки наблюдения после экстракции катаракты с имплантацией ИОЛ у детей, оперированных в возрасте от 1 до 12 месяцев / Зайдуллин И.С., Азнабаев Р.А. // Офтальмохирургия. – 2010. – № 6. – С. 26 —28.

2. Катаргина Л.А. Хирургическая тактика и особенности интраокулярной коррекции у детей с врожденными катарактами первого года жизни / Катаргина Л.А., Круглова Т.Б., Кононов Л.Б., Егиян Н.С. // Невские горизонты: Материалы конф. офтальмологов. – СПб., 2010. – С. 233 —238.

3. Круглова Т.Б. Итоги и перспективы лечения детей с врожденными катарактами / Круглова Т.Б. // Детская офтальмология. – М., 2006. – С. 45 – 49.

4. Паштаев Н.П. Результаты лечения врожденной катаракты у детей и подростков до 14 лет / Паштаев Н.П., Поздеева Н.А., Лукин В.П., Толмачева Т.Г., Никитин В.П., Тихонова О.И. // Современные технологии в офтальмологии. – М., 2014. – № 3 – С. 73.

УДК 616.2, УДК 616.21

А.А. Поморцева, Л.Г.Елкина О ЛЕЧЕНИИ ПОЛИПОЗНОГО РИНОСИНУСИТА

Кафедра оториноларингологии
Ижевская государственная медицинская академия
Ижевск, Российская Федерация

A.A. Pomortseva, L.G.Elkina ON THE TREATMENT OF POLYPOID RHINOSINUSITIS

Department of otorhinolaryngology
Izhevsk State Medical Academy

Izhevsk, Russian Federation

Контактный E-mail: anka3991@mail.ru

Аннотация. В общей структуре заболеваемости ЛОР-органов полипы носа занимают далеко не последнее место. Распространенность клинически манифестированных форм среди различных групп населения составляет от 1 до 5%. Эпидемиологические исследования, проведенные в России, выявили полипозный риносинусит у 1-1,3% обследованных.

Единой теории этиопатогенеза на сегодняшний день не существует. С большой долей уверенности можно говорить, что полипозный риносинусит является полиэтиологичным заболеванием. Нередко полипы сочетаются с бронхиальной астмой 45%, с пищевой и лекарственной аллергией в 32% случаев, 12% с другими заболеваниями.[1]

Annotation. In general the structure of morbidity otolaryngology nose polyps occupy not the last place. The prevalence of clinically manifest forms among different population groups is from 1 to 5%. Epidemiological studies conducted in Russia, found polypoid rhinosinusitis in 1-1.3% of patients.

Unified theory of etiopathogenesis today does not exist. With great certainty we can say that is a polypoid rinosinut polyetiology disease. Often polyps are combined with bronchial asthma 45%, with the food and drug allergy in 32% slauchae, 12% to other diseases. [1]

Ключевые слова: полипы, околоносовые пазухи, риносинусит, оториноларингология, бронхиальная астма.

Keywords: the polyps, paranasal sinuses, rhinosinusitis, otorhinolaryngology, bronchialastma

Цель исследования – оценить особенности течения и лечение полипознориносинусита у пациентов на территории Удмуртской Республики, обращавшихся за оториноларингологической помощью в 2014-2015 гг. (2 года).

Материалы и методы исследования

На базе оториноларингологического отделения РКБ г. Ижевска был проведен анализ 186 историй болезней пациентов в возрасте от 20 до 90 лет, находившихся на стационарном лечении.

Результаты исследования и обсуждение

За 2014-2015 год на стационарном лечении в ЛОР-отделении РКБ г. Ижевска находились 186 (8,7%) пациентов с диагнозом полипы носа. 173 (93%) пациента были прооперированы. Из 186 больных 66 (35,5%) были повторными полипотомиями.

В исследуемой группе сельские жители составили 91 (48,9%) человек, городские — 95 (51,1%). Женщин — 67 (36,0%), мужчин — 119 (64%). Средний возраст больных составил 40 лет.

Из 186 пациентов 102 (54,8%) имели сопутствующую патологию. Бронхиальная астма наблюдалась у 41 (22,4%) человека, пищевые и лекарственные аллергии — у 35 (18,8%), вазомоторный ринит — у 15 (8,1%) пациентов.

Полипозный риносинусит у 100% сопровождался поражением околоносовых пазух: решетчатого лабиринта у 52 (28,0%), гайморовых пазух у 31 (16,7%) , пансинуситов у 23 (12,4%), сочетание поражения клеток решетчатого лабиринта и гайморита у 54 (29,0%), у остальных 2,9 % больных поражение других пазух. Состояние околоносовых пазух на момент поступления: в стадии обострения у 104 (55,9%), ремиссии — 82 (44,1%).

173 пациентам с полипами было проведено хирургическое лечение: из них классическая полипотомия была у 49 (37,3%), эндоскопическая полипотомия у 124 (72,7%). Полипотомия с гайморотомией 9 (4,1%), с этмоидотомией 13 (7,5%), с вазотомией 14(8,1%), с септопластикой 17 (9,8%).

До операции было проведено лечение бронхиальной астмы дексаметазоном (внутривенно капельно 8 мг на 100 мл физиологического раствора 1 раз в сутки, курс 4 дня).

У большинства больных с повторными полипотомиями наблюдались бронхиальная астма, аллергия и другие заболевания.

Выводы:

1. Полипозный риносинусит занимает значительное место в структуре заболеваний ЛОР органов.

2. Встречаемость носовых полипов зависит от пола человека: наиболее часто полипы носа обнаруживаются у лиц мужского пола, средний возраст которых 40 лет. Это является глобальной проблемой, так как мужчины трудоспособного возраста вынуждены длительно находиться на больничном листе, а с бронхиальной астмой еще и теряют трудоспособность.

3. Из 186 человек 102 пациента имели сопутствующую патологию, что свидетельствует о наличии связи появления полипов с сопутствующими заболеваниями.

4. Среди сопутствующей патологии бронхиальная астма, а в особенности аспиринная форма, занимает определенное место, что дает повод предполагать ее как провоцирующий фактор в развитии полипов.

5. Полипы часто имеют рецидивирующее течение и сопровождаются повреждением околоносовых пазух.

6. Хирургическое лечение полипозного риносинусита представлено, в основном, эндоскопической полипотомией.

Литература:

1. Рязанцев С.В. Клинические рекомендации «Полипозный риносинусит» / Рязанцев С.В., Лопатин А.С., Пискунов Г.З., Корнеева О.В. // М.,-СПб.,2014.-С 3,8,16.

2. Г.З. Пискунов Клиническая ринология/ Г.З.Пискунов, С.З.Пискунов. // М.: МИКЛОШ, 2002 - С. 197-236 - С. 265-270 - С. 281-285.

3. Пальчун В.Т. Оториноларингология/ Пальчун В.Т., Магомедов М.М., Лучихин Л.А. // М.: ГЭОТАР-Медия, 2011. - С. 138-177 - С. 203.

4. Дайхес Н.А. Оториноларингология. Материалы к клиническим лекциям / Дайхес Н.А. // В 5 томах: Том 1 / М.: МИА, 2010 - С. 210.

УДК 617.7-007.681

А.А. Рачинская, Я. А. Ясюкевич
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИМПЛАНТАЦИИ КЛАПАНА АХМЕДА У
ПАЦИЕНТОВ ПРИ ХИРУРГИЧЕСКОМ ЛЕЧЕНИИ ГЛАУКОМЫ

Кафедра глазных болезней
Белорусский государственный медицинский университет
Минск, Республика Беларусь

A. A. Rachynskaya, Y. A. Yasiukevich
AHMED VALVE IMPLANTATION EFFECTIVENESS IN PATIENTS
IN THE SURGICAL TREATMENT OF GLAUCOMA

Department of Ophthalmology
Belarusian State Medical University
Minsk, Republic of Belarus

Контактный e-mail: lukh.lesya@gmail.com

Аннотация. В статье рассмотрены ранние послеоперационные результаты гипотензивного эффекта имплантации переднекамерного клапана Ахмеда при хирургическом лечении 72 пациентов с различными формами глаукомы (открытоугольная, закрытоугольная, смешанная, рефрактерная, неоваскулярная).

Annotation. The article describes the early postoperative results of the hypotensive effect of anterior chamber implantation of Ahmed valve in the surgical treatment of 72 patients with various forms of glaucoma (open-angle glaucoma, angle closure glaucoma, mixed, refractory, neovascular).

Ключевые слова: клапан Ахмеда, рефрактерная глаукома, внутриглазное давление, острота зрения, артификация.

Keywords: Ahmed valve, refractory glaucoma, intraocular pressure, visual acuity, pseudophakia.

Цель исследования – оценить эффективность снижения внутриглазного давления при хирургическом лечении с имплантацией клапана Ахмеда у пациентов с различными формами глаукомы.

Материалы и методы исследования

Ретроспективно изучены истории болезни 72 пациентов в возрасте от 28 до 90 лет (средний возраст $67 \pm 18,58$ лет); мужчин 44 (61,11%), женщин 28