

Клинический опыт применения лекролина при лечении аллергических конъюнктивитов

**С. А. Коротких, Л. Я. Яблонская, М. Э. Коротких,
Н. В. Муратова**

г. Екатеринбург

Аллергические конъюнктивиты развиваются в следствие повышенной чувствительности организма к аллергену, и могут быть приобретенными или возникать при наследственной предрасположенности.

В связи с отсутствием высокоэффективных противоаллергических капель местное лечение заключается в применении гормональных средств, которые имеют ряд побочных эффектов.

Фирма Leiras выпускает новые глазные капли лекролин, действующим веществом которого является кромогликат натрия, стабилизирующий мембраны тучных клеток и предотвращающий высвобождение медиаторов аллергии.

Нами проведен сравнительный анализ двух групп больных с аллергическими конъюнктивитами. В первой группе использовали традиционное лечение, во второй - сочетание лекролина местно с общими десенсибилизирующими средствами.

В результате проведенного исследования были получены следующие результаты.

При применении лекролина уже на 2-3 сутки мы наблюдали уменьшение отека слизистой, количества фолликулов, пациенты отмечали улучшения субъективного характера. В течение 7-10 дней исчезали чувство тяжести, «песка» в глазах, зуда, слезотечения.

Объективно: уменьшалась гиперемия слизистой, в значительной степени сокращалось число фолликулов, снимался отек век и слизистой. Ни в одном случае не было отмечено признаков непереносимости препарата.

В сравнении с гормональными препаратами следует отметить более продолжительное действие лекролина без развития привыкания. При применении кортикостероидов наблюдается первичное значительное улучшение с развитием зависимости при длительном применении.

Наилучшие результаты, однако, получены нами при сочетании местной капельной терапии лекролином с фоновой терапией десенсибилизирующими средствами. Это связано с тем, что аллергиче-

ская реакция, независимо от проявлений, является. Тем не менее, проявлением нарушений на уровне всего организма, что требует соответствующей коррекровки.

Вывод: Лекролин является эффективным препаратом в лечении аллергических конъюнктивитов, применение его особенно эффективно в сочетании с фоновой десенсибилизирующей терапией.